


Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern in Sojabohnen

Versuchsergebnisse von 2010 und 2011
und Empfehlungen


Kerstin Hüsgen
Feldtag im Rahmen der Eiweißinitiative
Hirrlingen, 19.07.2012




Unkrautspektrum




Wirksamkeit verschiedener Herbizide gegen Hühnerhirse (UDG: 7%, n = 2)



Wirksamkeit verschiedener Herbizide gegen Weißer Gänsefuß (UDG = 17%, n = 4)



Wirksamkeit verschiedener Herbizide gegen Klettenlabkraut (UDG = 24%, n = 2)



Herbizid-Empfehlungen in Sojabohnen

- Vorauflauf-Anwendung mit breit wirksamen Bodenherbiziden:
Spectrum + Sencor WG + Centium 36 CS* (0,8 + 0,3 + 0,25 l/ha)
Artist (2,0 kg/ha) (evtl. + 0,2 l/ha Centium 36 CS*)

* nur mit Einzelfallgenehmigung nach § 22 (2) PflSchG einsetzen

- Nachauflauf-Anwendung mit Blattherbiziden gegen Unkräuter:
Harmony SX (2x 7,5 g/ha im Abstand von 10 – 14 Tagen)
Basagran (1,0 – 2,0 l/ha) **Auflagen unbedingt beachten!**

- Nachauflauf-Anwendung mit Blattherbiziden gegen Ungräser:
Fusilade MAX (1,0 – 2,0 l/ha)
Focus Ultra (1,5 – 2,0 l/ha)

- Bekämpfung von ausdauernden Unkräutern, z.B. Disteln und Winde, muss in den Vorkulturen konsequent durchgeführt werden
- Bekämpfung von Altunkräutern vor der Saat durch Bodenbearbeitung oder einem gezielten Glyphosat-Einsatz

